



Grupe vaginalnog sekreta

Ono što nam niko ne objašnjava: koliko ih ima i šta označavaju

Multi-Gyn®



multi-gyn.rs

facebook.com/MultiGyn.Srbija twitter.com/multigynsracija



Pregled vaginalnog sekreta je jednostavna i bezbolna metoda ispitivanja sekreta uzetog iz vagine, sa prednje i zadnje usne i kanala grlića materice. Od uzetog uzorka se pravi citološki razmaz koji se fiksira na mikroskopskoj pločici i boji specijalnim bojama. Posle bojenja vrši se mikroskopska analiza morfološkim osobina sekreta i ćelija u njemu u toku koje se mogu otkriti znaci zapaljenja vagine, grlića materice, uzročnici infekcije, dobroćudne i zloćudne ćelije i druge patohistološke promene.

Šta tačno koje grupe sekreta kod žena znače i kako se leče?



Razlikujemo šest grupa vaginalnog sekreta (vaginalne čistoće):

Prva grupa vaginalnog sekreta odlikuje se prisustvom sluzi, ponekog leukocita i mnoštvom Doderleinovih bacila. Ovaj nalaz je dosta redak i susreće se kod devojčica pre puberteta

Druga grupa vaginalnog sekreta sadrži malo leukocita i sluzi, dosta Doderleinovih bacila, poneki streptokok, stafilokok i redak bacil koli. Takav nalaz se smatra normalnim.

Treća grupa vaginalnog sekreta sadrži dosta leukocita, mnoštvo patogenih bakterija, nema Doderleinovih bacila, katkad se može naći i poneki Trihomonas vaginalis. Sekret tada ističe iz vagine, prlja donji veš žene i stvara okolno crvenilo, svrab i bol. Nekada može proći nezapaženo i bez reakcije. Veliki procenat žena ima u svom nalazu treću grupu vaginalnog sekreta koji, bez obzira na to da li vaginalne tegobe postoje ili ne, treba da se leči upravo zbog toga što se infekcija ushodno širi i neopaženo prelazi u hronična zapaljenja.



Četvrta grupa vaginalnog sekreta karakteriše se obilnim žutin sekretom. Izazivač je gram–negativni diplokok–gonokok. Veoma brzo se širi i zahvata veliki broj seksualno aktivnih, a promiskuitetnih osoba, tako da u kratkom vremenskom intervalu oboli veći broj osoba. U narodu ova vrsta polno prenosive bolesti poznata je pod nazivom „triper“ ili „kapavac“, upravo zbog sekrecije koja se prilikom pritiska na penis iz njega izliva kapanjem. Iz tih razloga, skoro uvek se na pregled javlja muškarac koga peckanje pri mokrenju i obilje sekrecije upućuju na pregled. Istovremeno se sprovodi lečenje i muškarca i žene, antibiotikom na koji je uzročnik osetljiv. Gonokokna infekcija nekada prođe nezapaženo, ili se usled nedovoljnog terapijskog tretmana gonokok preseli ushodno i ugnezdi u cervikalnim žlezdama, tako da tu može dugo da nezapaženo boravi, ali i da izazove veoma ozbiljna oboljenja organa karlice.

Peta grupa vaginalnog sekreta izazvana je bičarem koji je normalan stanovnik završnih partija debelog creva—*Trichomonas vaginalis*. Aktivno se kreće, pa nepravilna higijena (pranje odozdo na gore ili nepravilno brisanje posle defekacije), kao i niz drugih momenata, mogu dovesti do infekcije ovim dosta upornim, neprijatnim i recidivima sklonim uzročnikom. Pored seksualnog puta, u ginekologiji veliki značaj u infekciji trihomonasom imaju mokračni kateteri, pa se zato preporučuje upotreba samo sterilnih katetara za jednokratnu upotrebu.



Šesta grupa vaginalnog sekreta nastaje usled infekcije kandidom albikans. U preparatu se nalazi dosta leukocita, deskvaminisanih ćelija, sluz i kolonije gljivica kandide albikans, koja na sluzokoži vagine stvara malinast izgled, pa se dijagnoza može postaviti sa sigurnošću i bez uzimanja brisa. Isti taj uzročnik kod novorođenčadi može da izazove soor (mlečac), pa razlog infekcije treba potražiti u porođaju i kasnijoj higijeni ruku. Ova vrsta infekcije se prenosi polnim putem, a kisela sredina pogoduje za njen razvoj.

Tegobe intimnog područja možete sprečiti ili tretirati tako što ćete svom telu pomoći da zadrži ili obnovi zdravu vaginalnu floru.

To se može pomoći:

- Higijenskih mera. To su pranje, vaginalno ispiranje i neophodne mere zaštite pri polnom odnosu.
- Primene bioaktivnog vaginalnog gela.



Polne bolesti treba tretirati sa lekovima propisanim od strane lekara uz koje možete koristiti Multi-Gyn proizvode.

Multi-Gyn ActiGel

Sprečava i leči bakterijsku vaginuzu (BV)



multi-gyn.rs

facebook.com/MultiGyn.Srbija twitter.com/multigynsracija